

## Übungen zu

SS 2003

Analysis II

Serie 9

1. Seien  $E, F$  Banach-Räume über  $\mathbb{K}$ , und sei  $b: E \times E \rightarrow F$  eine stetige bilineare Abbildung. Man zeige, daß durch  $x \mapsto b(x, x)$  eine Fréchet-differenzierbare Abbildung  $h: E \rightarrow F$  definiert wird, und gebe ihre Ableitung an. Wie sieht diese aus, wenn  $b$  symmetrisch ist?
2. Man zeige, daß durch  $(x, y) \mapsto (xy, x^2 - y)$  eine Fréchet-differenzierbare Funktion  $h: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  definiert wird, und gebe für jeden Punkt von  $\mathbb{R}^2$  ihre Jacobi-Matrix an.
3. Seien  $E, F$  Banach-Räume über  $\mathbb{K}$ , und sei  $h: E \rightarrow F$  *homogen vom Grade 1*, i.e.:  $h(tx) = th(x)$  für alle  $t \in \mathbb{R}_{>0}$  und  $x \in E$ . Man zeige: Ist  $h$  differenzierbar im Punkte  $0$ , so ist  $h$  linear und stetig. Man folgere daraus, daß keine Banach-Raum-Norm im Nullpunkt differenzierbar ist.
4. Sei  $(p, q) \in \mathbb{R}^2$ . Man zeige: Die Maximum-Norm  $\|\cdot\|_\infty$  auf  $\mathbb{R}^2$  ist genau dann in  $(p, q)$  differenzierbar, wenn  $|p| \neq |q|$ .