

Übungen zu

SS 2003

Lineare Algebra II

Serie 4

1. Sei $F \in K^{n \times n}$ in einer Blockdarstellung der folgenden Form gegeben:

$$F = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix}.$$

Man zeige: $\det(F) = \det(A) \det(D)$.

2. Sei V ein Vektorraum, und seien X, Y Teilmengen von V . Man zeige, daß die folgenden Bedingungen äquivalent sind:

(1) $X \cup Y$ ist linear unabhängig, und $X \cap Y = \emptyset$.

(2) X, Y sind linear unabhängig, und $\langle X \rangle \cap \langle Y \rangle = \{0\}$.

3. (Basis-Ergänzung) Sei V ein n -dimensionaler Vektorraum, T ein Teilraum von V und (v_1, \dots, v_k) eine geordnete Basis von T . Man zeige:

(a) Ist U ein Komplement von T und $(v_{k+1}, \dots, v_{k+\ell})$ eine geordnete Basis von U , so ist $k+\ell=n$ und (v_1, \dots, v_n) eine geordnete Basis von V .

(b) Es gibt Vektoren $v_{k+1}, \dots, v_n \in V$ derart, daß (v_1, \dots, v_n) eine geordnete Basis von V ist.

4. (a) Man zeige: Ist φ ein Endomorphismus von \mathbb{R}^3 , aber keine Streckung, so gibt es einen mindestens 2-dimensionalen φ -zyklischen Teilraum von \mathbb{R}^3 .

(b) Man gebe einen Endomorphismus φ von \mathbb{R}^3 an derart, daß φ keine Streckung ist und \mathbb{R}^3 nicht φ -zyklisch ist.